



Diagram 19. Vilken typ av narkotika används? Anges i procent av dem som svarat att de använt narkotika





Erfarenheter från Colorado efter legaliseringen av cannabis avseende akuta sjukdomsfall

Sjukhusens akutmottagningar fick ta emot 57% fler marijuanarelaterade fall från 2011 till 2013.

Antalet sjukhusinläggningar ökade med 82% mellan 2008 och 2013.

Flest fall i Denver där akutbesöken för marijuana är 45 procent högre än i övriga delstaten.



Erfarenheter från Colorado efter legaliseringen av cannabis

Ökad användning såväl bland barn och ungdomar som vuxna

Kraftigt ökat antal akuta sjukdomsfall

Ökat antal brott kan kopplas till droganvändning

Ökat antal dödliga trafikolyckor kopplas till cannabisanvändning

Fler skolsuspensioner

Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife

Madeline H. Meier Avshalom Caspi Antony Ambler HonaLee Harrington Renate Houts
Richard S. E. Keefe Kay McDonald Aimee Ward Richie Poulton and Terrie E. Moffitt

(PNAS vol.109 no 40 E2657-E2664)

Allt färre ungdomar tror att regelbundet cannabisbruk är skadligt för hälsan. Åldern för debut är i sjunkande samtidigt som allt fler röker dagligen.


Syftet med denna studie var att visa på samband mellan ihållande bruk och avtagande neuropsykologisk funktion

Prospektiv studie av 1037 nyfödda upp till 38 års ålder. Intervjuer (upprepade i olika åldrar), skattningar, neuropsykologiska tester före debut (13 år) och vid 38 års ålder när ihållande bruk konstaterats.

Ju mer ihållande bruk desto sämre kognitiv förmåga.

Bestående kognitiv nedsättning vid tidig debutålder även hos de som avbröt sitt missbruk.

Cannabis Use and Later Life Outcomes Are Dose Dependent



Source: Fergusson and Boden. *Addiction*, 103, pp. 969-976, 2008.

Continued cannabis use and risk of incidence and persistence of psychotic symptoms: 10 year follow-up cohort study




Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis





Figure 1: Unadjusted odds ratios (log scale) between maximum frequency of cannabis use before age 17 years and young adult outcomes in combined data, compared with individuals who have never used cannabis



En typisk haschrökare

Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva.

Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv

Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet.

Det är aldrig hans fel, externalisering eller projicering av sina problem.

Han är övertygad om att han fungerar adekvat.

En typisk haschrökare

Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende.

Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad.

Oförmögen att vidmakthålla en dialog.

Problem med koncentration och uppmärksamhet.

Rigida åsikter och färdiga svar

Jag är annorlunda, jag är unik.